

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BONNES

Gultures

Frandes (

S.R.P.V. POITOU - CHARENTES Bulletin technique n° 26 du 27 septembre 2006 (1 page)

AGRICOLES

COLZA: Stade 2 à 7 feuilles

Petites altises

POUR

La surveillance doit être maintenue sur les quelques rares parcelles qui n'ont pas encore atteint le stade B2.

Une intervention sera alors justifiée, avec un produit à base de lambda-cyhalothrine ou de deltaméthrine autorisé pour cet usage, dès que vous avez 30 % de pieds avec pigûres.

Tenthrèdes

Le vol d'adultes se termine.

De nombreux traitements ont été réalisés sur larves. Surveillez les parcelles les plus tardives, non encore protégées; et intervenir si nécessaire à l'apparition des premiers dégâts.

Grosses altises

Des captures inhabituellement importantes ont été enregistrées en Charente, sur les postes de Brie et Aussac (60 captures chacun).

Les prises sont plus modestes ailleurs, bien qu'effectives sur l'ensemble des postes. A ce jour, on approche des 200 insectes piégés.

Le traitement spécifique grosse altise devra être réalisé autour du 10 octobre. Les femelles arrivant immatures sur les cultures et la maturation sexuelle demandant 15 à 20 jours, il est aujourd'hui beaucoup trop tôt pour intervenir.

Choisissez une journée favorable à l'activité du ravageur, pour réaliser votre intervention.

Pucerons

PRATIQUES

Un réseau de surveillance pucerons en Poitou est mis en place par TERRENA-Poitou, avec le concours de SYNGENTA pour les tests virulifères.

Ce réseau (Vigie-Virose) compte 15 postes avec plaques engluées pour les captures avec relevé hebdomadaire (lundi). Toutes les semaines, la protection des végétaux vous informera des niveaux de captures et du pouvoir virulifère des pucerons verts capturés sur le réseau.

Semaine 38 : 127 captures (1 à 43 par site) pour 12 relevés.

Le pouvoir virulifère est faible sur 6 postes.

Il est **moyen** sur 5 postes : Saint Léger de Montbrillais, Sérigny, Ingrandes, Jardres (86) et Bressuire (79).

Il est fort à Saint Pardoux (79).

Au delà de ces chiffres, rappelons que le seuil d'intervention reste à 20 % de pieds porteurs de pucerons (verts et cendrés); le pouvoir virulifère étant un élément d'information complémentaire intéressant.

Actuellement, les seuils ne sont pas atteints et il est trop tôt pour intervenir

Phoma

Les observations récentes montrent que la maturation n'a pas évolué et qu'aucune projection n'a eu lieu.

\mathbf{M}

COLZA

Grosses altises: Captures en progression surtout en Charente

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux 13 Route de la forêt 86580 BIARD BIARD Fax: 05 49 62 98 25 Pax: 05 49 62 98 26

S. DUTARTRE

Site internet: www.srpvpoitoucharentes.com
E-mail: srpv.draf-poitoucharentes@agriculture.g

ouv.fr
Publication périodique
C.P.P.A.P. n°1664-AD
ISSN n°0294-4693

0

03 5° 5° 4083°

